



## PERSONAS EN RIESGO.

- Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años.
- Han tenido más de 3 compañeros sexuales.
- Han tenido más de 3 partos.
- Fuman.
- Tienen problemas de desnutrición.
- Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz.



# Sostenibilidad

**Oficinas Parque Industrial.**  
**Dirección: Calle 60 diag. No. 493, 97300 Mérida, Yucatán.**  
**Teléfono: +529999302680 ext. 1336**  
**Correo: sostenibilidad@bepensa.com**



## CÁNCER CERVICOUTERINO

- ¿Qué es el cáncer cervicouterino?
- Factores de riesgo.
- Prevención
- Tratamiento.

## ¿QUÉ ES?

Es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y duran así varios años.

Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso.

Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y quimioterapia en los casos más avanzados.

## CAUSAS.

Casi 9 de cada 10 pacientes con Cáncer Cervicouterino tienen el antecedente de estar infectadas con el virus del papiloma humano, especialmente los tipos 16 y 18. Por lo que se recomienda en la actualidad los métodos de protección en relaciones sexuales y la vacuna anti VPH.

## PREVENCIÓN PRIMARIA.

A toda mujer que inicia su vida sexual activa se le debe realizar un Papanicolau, el cual es un examen médico en busca de anomalías en el cuello uterino, desde lesiones hasta tumores.

Si no se ha iniciado la vida sexual para los 18 años se recomienda de igual manera realizarlo a esta edad y anualmente posterior a esto.

El condón y el diafragma vaginal son los métodos más efectivos para prevenir el contagio del VPH y por ende disminuye el riesgo de Cáncer Cervicouterino

Dolor, pérdida de peso, malestar general.

## SINTOMAS.

El cáncer da síntomas usualmente cuando esta avanzado por lo que el estudio anual del Papanicolau es lo mas importante en la actualidad. Pero puede presentar los siguientes síntomas

- Dolor coital
- Sangrados Anormales
- Secreción transvaginal
- Pérdida de Peso
- Infecciones recurrentes

## INFORMACIÓN ADICIONAL.

El cáncer Cervicouterino es una de las principales causas de muerte en la mujer hoy en día en nuestro país. Por eso es de suma importancia realizarse el examen del Papanicolau, pues en etapas tempranas el cáncer tiene altas probabilidades de ser curado.

**Bepensa**