



TRATAMIENTOS.

En la actualidad los tratamientos son altamente efectivos pero por ningún motivo se suspenderá la toma de la medicación. Con un buen tratamiento y supervisión por un infectólogo, prácticamente se puede tener una vida normal. Se busca llegar a cargas indetectables en sangre para lo cual se pedirán los siguientes estudios:

- Carga Viral.
- Conteo de Linfocitos CD4 y CD8.
- En base a esto se mide la eficacia del tratamiento.



Sostenibilidad

Oficinas Parque Industrial.
Dirección: Calle 60 diag. No. 493, 97300 Mérida, Yucatán.
Teléfono: +529999302680 ext. 1336
Correo: sostenibilidad@bepensa.com

VIH Y SIDA.

- ¿Qué es el VIH?
- ¿cuándo se transforma en sida?
- Factores de riesgo.
- Prevención.

¿QUÉ ES?

El virus de la inmunodeficiencia humana, es un patógeno que tiene preferencia por las células de defensa del cuerpo llamados Linfocitos.

Si esta infección llega a etapas tardías, se llama Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en esta etapa el huésped del virus es susceptible a infecciones severas por microorganismos oportunistas.

El virus usualmente se transmite por vía sexual, otras vías de transmisión son por transfusiones con sustancias contaminadas o compartir material punzocortante (agujas) con gente infectada.

FACTORES DE RIESGO.

- Otras enfermedades de transmisión sexual.
- Tener relaciones sexuales sin protección.
- Trasplantes o procedimientos sin garantía de seguridad.
- Compartir agujas (Usuarios de drogas).
- Múltiples parejas sexuales.

SÍNTOMAS.

En las primeras semanas que siguen al contagio, las personas a veces no manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta. A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos.

PREVENCIÓN.

- Uso de preservativos masculino o femenino.
- Pruebas de detección de VIH vida sexual activa.
- Asesoramiento en caso de infección.
- La circuncisión en varones de manera electiva.
- Uso de antiretrovirales en caso de accidente relacionado al cuidado de la salud con un paciente positivo o probablemente positivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL.

EL VIH ANTES ERA UNA ENFERMEDAD CON UNA ALTA TASA DE LETALIDAD, ACTUALMENTE PUEDE SER CONTROLADO CON LOS MEDICAMENTOS MÁS NUEVOS. AUN ASÍ, LO QUE SE PREFERE ES LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN. POR LO QUE LOS MÉTODOS DE BARRERA SON ALTAMENTE RECOMENDADOS EN PACIENTES SEXUALMENTE ACTIVOS.

Bepensa

HIV - Test